

## INVITO ALLA VACCINAZIONE GRATUITA PER TUTTI GLI ALUNNI DI ETA' COMPRESA TRA I 12- 18 ANNI

**CONTRO DIFTERITE-TETANO-PERTOSSE-POLIO  
(DTPP)**

**CONTRO IL PAPPILLOMAVIRUS (HPV)**

**CONTRO IL MENINGOCOCCO (CEPPI ACWY E  
CEPPO B)**

### **PERCHÉ È IMPORTANTE VACCINARSI?**

#### **Vaccinazione contro Difterite –Tetano-Pertosse-Poliomielite**

**In adolescenza deve essere somministrata** la quinta dose di richiamo obbligatoria di vaccino anti-Difterite, Tetano, Pertosse e Polio . Si tratta del richiamo di una vaccinazione già effettuata nell'infanzia.

Il vaccino permette all'organismo di sviluppare le difese immunitarie in tutta sicurezza, proteggendoci contro malattie, che, altrimenti, potrebbero mettere a rischio la nostra salute e la nostra vita: il richiamo, durante l'adolescenza, è fondamentale per rafforzare la protezione immunitaria.

È importante altresì ripetere una dose di anti-Difterite, Tetano e Pertosse ogni 10 anni durante tutta la vita.

È una vaccinazione prevista dal Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale ed è gratuita. Il vaccino può essere co-somministrato con altri.

## **In questa fascia di età la Regione Calabria offre altresì gratuitamente le vaccinazioni fortemente raccomandate contro il Papilloma virus e i Meningococchi**

**Il virus del HPV** è responsabile del tumore al collo dell'utero nella donna, ma anche di numerosi altri tumori maligni genitali e orali maschili e femminili, nonché di condilomi e verruche genitali.

La vaccinazione contro il Papilloma virus può prevenire fino a quasi il 90% di tutti i tumori HPV-correlati; inoltre la vaccinazione è più efficace prima di una possibile trasmissione del virus che avviene per lo più per trasmissione sessuale. Il dodicesimo anno di vita è l'età indicata per la vaccinazione anti-HPV nel Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale ed è gratuita.

**quante dosi servono?** La vaccinazione prevede un ciclo di due dosi nell'arco di circa 6/12 mesi entro i 14 anni. Dai 15 anni in poi servono 3 dosi. Il vaccino può essere co-somministrato con altri.

**Il batterio del Meningococco** rappresenta la principale causa nel mondo di meningite (infezione delle membrane che avvolgono il cervello e il midollo spinale), ma può provocare anche una sepsi (infezione del sangue).

Non esiste un solo meningococco ma diversi tipi: i ceppi A, C, W135, Y sono la causa di circa il 30-50% delle forme di infezione per le fasce di età più a rischio (bambini, adolescenti e giovani) in Italia; il ceppo B di circa il 40-70% per le stesse fasce di età. L'infezione può progredire molto rapidamente e diventare potenzialmente fatale nell'arco di 24-48 ore (nel 10-15% dei casi) o lasciare danni permanenti (10-20% dei casi).

La trasmissione avviene per via aerea e attualmente la vaccinazione rappresenta l'unica arma di prevenzione efficace.

Le vaccinazioni antimeningococciche fortemente raccomandate dal Piano Vaccinale della Regione Calabria sono gratuite

**quante dosi servono?** I vaccini da eseguire sono due. Per il vaccino associato contro 4 ceppi di meningite ACWY è sufficiente una dose. Per il vaccino diretto contro il ceppo B il ciclo prevede 2 dosi. I vaccini possono essere co-somministrati.

## **LE VACCINAZIONI POTRANNO ESSERE EFFETTUATE PRESSO IL**

### **CENTRO VACCINALE DI CASTROVILLARI**

ASP COSENZA  
Igiene e Sanità' Pubblica  
d.ssa M.F. Piraino